

## ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

по медицинскому применению препарата

ЭНТЕРОСГЕЛЬ®

Enterosgel®

Торговое название препарата: Энтеросгель®

Международное непатентованное название.

Химическое название. Продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3 – тетрагидрокси – 1,3 диметилдисилоксана полигидрат.

Описание: однородная пастообразная масса от белого до почти белого цвета без запаха.

Лекарственная форма. Паста для приёма внутрь.

Состав препарата на 1,0 г.

Основное вещество

Полиметилсилоксана полигидрат - 0,7 г.

Вспомогательное вещество


Вода очищенная - 0,3 г.

Фармакотерапевтическая группа. Кишечные адсорбенты.

Код АТХ: А07В.

**Фармакологические свойства.** Энтеросгель® имеет пористую структуру кремнийорганической матрицы (молекулярная губка) гидрофобной природы, которая характеризуется сорбционным действием по отношению только к среднемолекулярным токсическим метаболитам (м.м. от 70 до 1000).

Энтеросгель® обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов, радионуклиды, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также



метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Энтеросгель® не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

**Фармакокинетика.** Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде в течение 12 часов.

**Показания к применению.** У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства:

- острые и хронические интоксикации различного происхождения;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжёлых металлов;
- острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллёз, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- гипербилирубинемия (вирусный гепатит) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);
- с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжёлых металлов).

**Противопоказания.** Индивидуальная непереносимость препарата, атония кишечника.

**Беременность и лактация.** Энтеросгель® не противопоказан при беременности и лактации.

**Способ применения и дозы.** Энтеросгель® пасту принимают внутрь за 1-2 часа до или после еды или приёма других лекарств, запивая водой.

Необходимое для приема количество препарата рекомендуется размешать в стакане в тройном объеме воды комнатной температуры или принимать внутрь, запивая водой.

Дозировка для взрослых – 22,5 г (1,5 столовой ложки) 3 раза в сутки (67,5 г).

Детям в возрасте от 5 до 14 лет - 15 г (1 столовая ложка) 3 раза в сутки (45 г).

Детям в возрасте до 5 лет – 7,5 г (0,5 столовой ложки) 3 раза в сутки (22,5 г).

Грудным детям рекомендуется 2,5 г (0,5 чайной ложки) препарата размешать в тройном объеме грудного молока или воды и давать перед каждым кормлением (6 раз в сутки).

Для профилактики хронических интоксикаций - по 22,5 г (1,5 столовой ложки) 2 раза в день в течение 7-10 дней ежемесячно.

При тяжёлых интоксикациях в течение первых трёх суток доза препарата может быть увеличена вдвое.

Продолжительность лечения при острых отравлениях 3 – 5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях 2 – 3 недели.

Повторный курс по рекомендации врача.

**Побочное действие.** Возможны тошнота, запор. При тяжёлой почечной и/или печёночной недостаточности возможно появление чувства отвращения к препарату.

**Передозировка.** Случаев передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Возможно уменьшение всасывания других препаратов при одновременном приёме с Энтеросгелем®.

**Особые указания.** Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила отдельного во времени приёма 1-2 часа до или после приёма других лекарственных препаратов.

**Форма выпуска.** Туба из комбинированных материалов 225 г в упаковке №1.

Тубы из комбинированных материалов с бушонами и контролем первого вскрытия в виде термопривариваемых к горловине тубы мембран. Каждую тубу

вместе с инструкцией по применению помещают во *вторичную упаковку* - коробку из картона.

**Условия хранения.** При температуре от + 4 °С до + 30 °С в местах, недоступных для детей. Препарат годен после вскрытия упаковки в течение 3-х месяцев. Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки. Беречь от замораживания.

**Срок годности.** 3 года. Не использовать по окончании срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта.

**Производитель.** ООО «ТНК СИЛМА». Россия, 399851, Липецкая обл., г.Данков, ул.Л. Толстого д. 32/2.

Тел./факс (495) 223-91-00. [www.enterosgel.ru](http://www.enterosgel.ru) e-mail: [contact@enterosgel.ru](mailto:contact@enterosgel.ru)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ООО «ТНК СИЛМА»

Э.Г.Кадничанский